

EXAMEN GRAD PRINCIPAL

sesiunea 2015

SPECIALITATEA: ASISTENT IGIENIST DE CABINET STOMATOLOGIC

TEST GRILA:

INTREBARI CU UN SINGUR RASPUNS CORECT DIN TREI

Prin raspuns corect se intelege completarea grilei de raspuns, prin umplerea cercului corespunzator literei cu raspunsul corect. La umplerea a doua sau trei cercuri si/sau in cazul taierii cu X a unui cerc umplut, intrebarea respectiva se noteaza cu 0 puncte. Fiecare intrebare cu raspuns corect se noteaza cu 1 punct.

1. Osul alveolar al copilului mic:

- a. este extrem de dens;
- b. este mai puțin dens;
- c. nu este acoperit de periost;

2. Xilina este:

- a. solubilă în apă
- b. insolubilă în apă
- c. insensibilă la lumină

3. Cea mai frecventă cauză a ectopei de canin este:

- a. existența unui capac osos dens
- b. existența unei fibromucoase dense
- c. reducerea sau absența spațului pe arcadă

4. Distrofiile dentare se diferențiază de caria simplă prin:

- a. pierderea de substanță dură dentară
- b. lipsa dentinei alterate
- c. teste de vitalitate pozitive

5. Gingivita cronică este cauzată de:

- a. trauma ocluzală;
- b. invazia țesutului gingival cu microorganisme;
- c. producții microorganismelor de la nivelul dinților și țesutului gingival.

6. La vârsta de 6 ani erup:

- a. primii molari inferiori, primii molari superiori și incisivii centrali superiori
- b. primii molari inferiori, primii molari superiori și incisivii centrali inferiori
- c. primii molari superiori, primii molari inferiori și caninii superiori

7. Apexul deschis „tipic” apare în următoarele situații:

- a. în traumatisme;
- b. tratamente ortodontice incorecte;
- c. necroza pulpară, înaintea creșterii rădăcinii;

8. Extractia dinților permanenți se indica:

- a. în cazul dinților cu distrucții coronoradiculare întinse
- b. dinților care nu întretin procese infecțioase
- c. dinților cu fracturi coronare în smalt.

9. Care este timpul de acțiune al acidului pentru a realiza gravarea acidă a smalțului?

- a. 15 secunde
- b. 30 secunde
- c. 40 secunde

10. Calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, este dovedită prin:

- a. certificatul de membru care se eliberează la înscrierea în organizația profesională;
- b. documente de studii care atestă formarea în profesie;
- c. orice documente.

11. După ce se recunoaște dentina sănătoasă, în cursul preparării cavităților:

- a. aspect;
- b. consistență;
- c. culoare;

12. În tratamentul tulburărilor de ritm cardiac, pentru calea intramusculară este indicată utilizarea unei doze de xilină:

- a. de 2, 5mg/kg
- b. de 3mg/kg
- c. de 4mg/kg

13. Adâncimea medie a șanțului gingival normal este de:

- a. 1, 5 mm
- b. 1, 8 mm
- c. 2 mm

14. Testul de vitalitate la rece arată:

- a. durere de origine pulpară,
- b. durere la un dinte cu gangrenă,
- c. durere la un dinte devital.

15. Pasta de dinți se folosește:

- a. la periajul zilnic,
- b. săptămânal,
- c. lunar,

16. Priza finală a cimenturilor ionomere de sticlă poate dura până la:

- a. 4 ore
- b. 4 săptămâni
- c. 4 luni

17. Extracția dentară este contraindicată în:

- a. S.I.D.A.,
- b. diabet,
- c. leucemie.

18. Placa dentară este formată inițial din:

- a. celulele epiteliale descuamate și mucina salivară;
- b. particule alimentare și mucina salivară;
- c. bacterii și produși bacterieni.

19. Un cabinet stomatologic este dotat cu:

- a. unit dentar, fotoliu dentar, compresor, aparatură de sterilizat, instrumentar,
- b. unit dentar, fotoliu dentar, instrumentar,
- c. unit dentar, fotoliu dentar, aparat de detartraj.

20. Care este cel mai folosit instrument pentru plasarea pastelor în canalele radiculare:

- a. plugger
- b. spreader
- c. acul Lentullo

21. Durata periajului dentar este de:

- a. 30 secunde,
- b. 1 minut,
- c. 3-5 minute,

22. Gradul de evaluare a igienei buco-dentară se face prin:

- a. consult stomatologic,
- b. colorarea plăcii dentare.
- c. model de studiu,

23. Erupția dinților temporari începe cu:

- a. caninii superiori
- b. incisivii centrali inferiori
- c. incisivii centrali superiori

24. Care este cea mai frecventă localizare a smalțului aprismatic:

- a. pe pantele cuspidene
- b. la vârful cuspidelor
- c. la colet

25. Perile de dinți moi sunt indicate pentru:

- a. suprafețe ocluzale,
- b. suprafețe linguale,
- c. șanțul gingival,

26. Pregătirea instrumentarului pentru examinări curente:

- a. se spală cu apă și săpun, se pun la sterilizat.
- b. se spală cu apă și săpun, se clătesc, se pun în soluție dezinfectantă.
- c. se pun în soluție de decontaminare, 30-60min, se spală cu apă și săpun, se clătesc, se pun în soluție dezinfectantă se clătesc, se sterilizează.

27. Mepivacaina:

- a. are acțiune vasoconstrictoare
- b. are acțiune slabă vasodilatatoare
- c. are toxicitate egală cu procaina

28. Ce materiale sunt indicate de a fi folosite, ca bază, sub restaurări fizionomice compozite?

- a. lineri pe bază de hidroxid de calciu
- b. ciment ionomer de sticlă
- c. zinc oxid eugenol

29. Nerealizarea anuală a numărului minim de credite stabilit de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se sancționează cu:

- a. avertisment;
- b. muștrare;
- c. suspendarea dreptului de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.

30. Conținutul tratamentului diastemei adevărate:

- a. se face până la alinierea incisivilor laterali în contact cu cei centrali
- b. se face dacă există tendința la recidivă
- c. se face până la completarea formulei dentare permanente

31. Hemoragia apărută la 2-3 ore de la extracție este:

- a. hemoragie tardivă,
- b. hemoragie precoce,
- c. hemoragie imediată prelungită,

32. Periajul frecvent previne formarea tartrului prin:

- a. neutralizarea acidității locale;
- b. îndepărtarea resturilor alimentare;
- c. dezorganizarea matricei plăcii;

33. Pentru prevenirea hemoragiei postextractionale ca tratament local se impun:

- a. sutura plăgii alveolare,
- b. evitarea chiuretajului alveolar,
- c. aplicarea de iodoform în plaga alveolară,

34. Ce tip de proiecție este cel mai frecvent utilizată pentru obținerea radiografiilor dentare:

- a. proiecția mandibulară
- b. proiecția posteroanterioară
- c. proiecția intraorală

35. Toaleta cavității în vederea efectuării tratamentului plăgii dentinare se face cu ajutorul:

- a. ser fiziologic;
- b. apă oxigenată;
- c. apă distilată;

36. Precizați care din aliajele de mai jos care au interfețe de contact cu titanul nu declanșează fenomene de coroziune calvanică?

- a. aliaje de Ni-Cr-Be
- b. aliaje nobile
- c. aliaje de Co-Cr

37. Grosimea minimă ocluzală a amalgamului este de:

- a. 1 mm
- b. 1, 5 mm
- c. 2 mm

38. Atitudinea față de plăgile postextractionale simple este:

- a. oprirea hemoragiei prin simplu tamponament,
- b. sutura plăgii,
- c. drenaj,

39. Placa dentară se formează pe smalț și pe:

- a. coroane acrilice, proteze acrilice;
- b. coroane de porțelan;
- c. toate cele enumerate.

40. Dacă un pacient își controlează eficient placa, care este intervalul necesar efectuării profilaxiei?

- a. nici unul;
- b. 3 luni;
- c. 6 luni;

41. Neplata cotizației datorată de membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancționează cu:

- a. suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate;
- b. muștrare;
- c. avertisment.

42. Dintele afectat de abces parodontal este:

- a. sensibil la percuție în ax,
- b. foarte mobil,
- c. ușor mobil,

43. Extracția dinților permanenți este indicată la:

- a. dinți cu carii superficiale,
- b. dinți cu pulpită,
- c. dinți ce împiedică redresarea ortodontică.

44. Cum se realizează corect dezinfectia mâinilor:

- a. spălarea mâinilor înainte de fiecare pacient cu apă și săpun, dezinfectia mâinilor cu soluții dezinfectante pt. mâini, ștergere cu șervetele,
- b. spălarea mâinilor înaintea primului și după ultimul pacient,
- c. spălarea mâinilor cu apă și săpun, dezinfectia mâinilor, ștergerea cu prosop,

45. Schimbarea perilor de dinți este bine să se facă:

- a. săptămânal,
- b. lunar,
- c. după 3 luni

46. Tratamentul curativ în alveolita postextracțională urmărește:

- a. combaterea anxietății,
- b. combaterea infecției,
- c. oprirea hemoragiei,

47. Rezorbția radacinilor dinților temporari începe:

- a. imediat după încheierea formării rădăcinii,
- b. la 6 luni după încheierea formării rădăcinii,
- c. cu 3-4 ani înainte de înlocuire,

48. În jurul vârstei de 13 – 14 ani cariile își fac apariția frecvent la nivelul:

- a. molarului de 6 ani;
- b. incisivilor superiori;
- c. premolarilor;

49. Incizia abcesului de loja submandibulară necesită:

- a. anestezie locală de contact
- b. anestezie generală prin intubație orotraheală
- c. anestezie generală de scurtă durată

50. Menținătoarele de spațiu trebuie să permită:

- a. restabilirea funcției estetice
- b. meziogresia intraosoasă a dinților distali
- c. rezolvarea malpozițiilor dentare

51. Care este dispozitivul folosit pentru obturarea rădăcinilor: curbe, strâmte și imature:

- a. plugger
- b. seringa presurizată Pulpadent
- c. spreader

52. În cazul pacienților cu angina pectorală se va da prioritate următoarelor anestezice loco-regionale:

- a. Procaina
- b. Octapresina
- c. Xilina

53. Detartrajul se efectuează :

- a. o dată la 6 luni,
- b. o dată pe an,
- c. nu este necesar

54. În cazul în care un asistent medical generalist, o moașă sau un asistent medical nu își exercită profesia o perioadă mai mare de 5 ani, reatestarea competenței profesionale a acestuia de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asisten

- a. obligatorie;
- b. opțională;
- c. nu este obligatorie.

55. Volumul salivei secretate în 24 ore este:

- a. 1500 ml
- b. 1200 ml
- c. 1800 ml

56. Adrenalina acționează direct asupra inimii, producând:

- a. creșterea presiunii sistolice și diastolice
- b. scăderea randamentului cardiac
- c. scăderea forței de contracție

57. Pentru precizarea diagnosticului chirurgical se folosesc următoarele:

- a. colorarea cu albastru de toluidina 1%
- b. radiografia,
- c. hemoleucograma

58. Sterilizarea prin aer cald se efectuează în pupinel la:

- a. la 60°C
- b. 100°C
- c. 180°C

59. Șocul anafilactic survine în următoarele circumstanțe:

- a. infarctul miocardic,
- b. administrarea de medicamente, înțepături de insecte, alergii alimentare,
- c. pierderea masivă de sânge.

60. Elementele de diagnostic pozitiv ale cariei simple sunt:

- a. prezența dentinei ramolite;
- b. retracția gingivală;
- c. percuția în ax pozitivă;

61. Înscrierea ca membru al organizației profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali se face la:

- a. filiala județeană în a cărei rază se află unitatea la care urmează să își desfășoare activitatea, filiala județeană în a cărei rază își au domiciliul sau reședința ori, în situații speciale, la Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști
- b. Ministerul Sănătății;
- c. Direcția de Dănătate Publică.

62. Autocurățirea se realizează prin:

- a. periaj dentar riguros,
- b. folosirea de dentifride
- c. mastică fiziologică,

63. Îndepărtarea contactului prematur de pe un dinte afectat parodontal duce din punct de vedere clinic la dispariția:

- a. mobilității;
- b. retracției;
- c. inflamației gingivale;

64. Pentru rezidiile contaminate (comprese, pansamente, seringi) din cabinetele stomatologice, normativele actuale impun:

- a. spălarea cu apă caldă și detergent,
- b. sterilizarea la pupinel,
- c. distrugere prin incinerare,

65. Timpul de priză al cimenturilor policarboxilat depind de:

- a. sterilitatea plăcii de sticlă pe care se omogienizează
- b. vârsta pacientului
- c. tehnologia de sinteză a pulberii

66. Asepsia reprezintă:

- a. metoda de distrugere a microorganismelor din abcese,
- b. metoda de tratament cu antibiotice,
- c. ansamblul metodelor care permit protejarea organismului împotriva contaminării cu germeni microbieni din exterior în cursul unei manopere medico-chirurgicale.

67. Aliaje convenționale pentru amalgame au un conținut de cupru redus, sub:

- a. 3%
- b. 6%
- c. 10%

68. Cauza cea mai frecventă a papilitei este:

- a. iritația cu pansament arsenical;
- b. tratamentul ortodontic incorect;
- c. iritația mecanică din timpul actului masticator sau a periajului;

69. În cazul femeilor gravide se recomandă evitarea traumatismelor operatorii în următoarele perioade de sarcină:

- a. prima lună
- b. primele două luni
- c. primele trei luni (perioada de organogeneză)

70. Gingivo-stomatita herpetică acută are o evoluție de:

- a. 1-3 zile
- b. 48-96 ore
- c. 7-10 zile

71. Cei mai importanți factori etiopatogenici generali ai anomaliilor dento-maxilare sunt:

- a. tulburările metabolice
- b. afecțiunile generale
- c. tulburările funcționare

72. Câte tipuri de abcese există la nivelul țesuturilor ce înconjoară dintele:

- a. angină Ludwig
- b. celulită
- c. gingival

73. Testele de vitalitate (electrice și termice) în cazul pulpopatiilor dinților permanenți tineri sunt:

- a. furnizează date precise privind starea pulpei;
- b. furnizează date numai prin compararea cu dinții adiacenți și contralaterali;
- c. permit cel mult aprecierea stării de vitalitate pulpară;

74. Dezinfecția reprezintă:

- a. o metodă de distrugere a microbilor din abcesul dentar,
- b. distrugerea microbilor patogeni existenți în afara corpului uman,
- c. distrugerea agenților microbieni din cavitatea bucală.

75. Furnizorii de educație continuă a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali se stabilesc de către:

- a. Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în colaborare cu Ministerul Sănătății;
- b. Ministerul Sănătății în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice;
- c. angajator.

76. La autoclav sterilizarea instrumentarului în cutii metalice se realizează:

- a. 10min la 60°C
- b. 15min la 60°C
- c. 30min la 121°C

77. Avizarea fișei de atribuții a posturilor de asistent medical generalist, moașă și asistent medical se face de către:

- a. angajator;
- b. Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
- c. nu se avizează.

78. Herpes zoster este:

- a. afecțiune infecțioasă acută
- b. afecțiune ereditară
- c. afecțiune infecțioasă cronică

79. După terapia activă, controlul pacientului se face:

- a. la 6 luni;
- b. anual;
- c. la diferite intervale, în funcție de reactivitatea tisulară, dexteritatea pacientului în menținerea controlului plăcii și motivația lui.

80. Erupecția herpetică se caracterizează prin:

- a. vezicule grupate în buchet
- b. papule
- c. pustule

81. pH-ul critic al plăcii bacteriene este:

- a. 3, 8
- b. 5, 5
- c. 5, 2

82. Examinarea unui bolnav cu o afecțiune oromaxilofacială urmează următoarele etape:

- a. examenul loco-regional, radiografii dentare,
- b. anamneza, examenul loco-regional, examenul general, examene paraclinice de laborator, ocluzia, radiografi dentare, model de studiu,
- c. examenul loco-regional, examene paraclinice de laborator.

83. Caninul superior permanent erupe normal la:

- a. 9 ani,
- b. 10 ani,
- c. 11 ani.

84. Clorura de zinc are efect de cauterizare chimică în concentrație de:

- a. 5-10%
- b. 30%
- c. 25%.

85. La autoclav sterilizarea se realizează:

- a. prin vapori de apă sub presiune,
- b. prin aer cald
- c. prin acțiunea radiațiilor ionice,

86. Controlul și supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical sunt realizate de:

- a. Ministerul Sănătății și de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
- b. organizații sindicale;
- c. alte organizații profesionale.

87. Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România:

- a. nu exclude răspunderea civilă, contravențională și penală;
- b. exclude răspunderea civilă;
- c. nu răspund disciplinar.

88. Normal la dentiția temporară:

- a. primul dinte erupe la 3 luni,
- b. primul dinte erupe la 4 luni și este incisivul central inferior,
- c. primul dinte erupe la 6 luni și este incisivul central inferior,

89. În ce zonă a coroanei dentare smalțul are grosimea maximă:

- a. la ecuatorul coronar
- b. coletul molarilor
- c. cuspizi molarilor

90. Care din variante este corectă privind alcătuirea externă a unui dinte:

- a. rădăcină, smalț,
- b. rădăcină, coroană, colet,
- c. coroană, pulpă dentară,

91. Avizul anual se acordă :

- a. numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv;
- b. numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă 3 luni;
- c. nu este obligatorie încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională;

92. Doza maximă permisă de cocaină, pentru o administrare nu trebuie să depășească:

- a. 16-20mg
- b. 20-30mg
- c. 30-50mg

93. Simptomul cel mai frecvent al traumei ocluzale îl constituie prezența:

- a. fațetelor de abraziere;
- b. fracturilor de smalț;
- c. mobilității dentare;

94. Secreția fluidului gingival

- a. crește în procesele inflamatorii;
- b. scade în procesele inflamatorii;
- c. crește în procesele inflamatorii și bolile hormonale

95. Ordinea în care erup dinții temporari este:

- a. incisiv central, incisiv lateral, canin, molar unu, molar doi,
- b. incisiv central, incisiv lateral, molar unu, canin, molar doi,
- c. incisiv central, incisiv lateral, molar unu, molar doi, canin,

96. Structura dinților permanenți este:

- a. dentina, camera pulpară,
- b. smalț, dentina, camera pulpară,
- c. smalț, cement, dentina, camera pulpară,

97. Complicațiile locale ale bolii parodontale

- a. cariile dentare,
- b. abcesele gingivale,
- c. pulpite purulente

98. Cea mai frecventă boală parodontală este reprezentată de:

- a. gingivită;
- b. parodontită;
- c. hipertrofia gingivală;

99. La bolnavii cu stomatită acută extracția dentară se efectuează:

- a. de urgență,
- b. sub protecție hemostatică,
- c. se temporizează,

100. Gingivita din leucemia acută:

- a. este difuză și cronică;
- b. se asociază cu paloare și serologie pozitivă;
- c. se asociază unor leziuni hemoragice;