

EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL

Sesiunea 2017

SPECIALITATEA IGIENIST DE CABINET STOMATOLOGIC

TEST - GRILĂ
DE VERIFICARE A CUNOȘTIȚELOR**1. În conformitate cu Legea 46/2003, prin intervenție medicală se înțelege:**

- a) totalitatea manevrelor efectuate în scop diagnostic
- b) orice tratament preventiv sau curativ care se aplică pacienților internați într-o unitate sanitară
- c) orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare

2. Recipientul în care se face colectarea deșeurilor periculoase rezultate din activități medicale:

- a) are culoarea galbenă, este din plastic rigid sau carton, în funcție de tipul de deșeu colectat, și se golește într-un recipient mai plin în vederea predării lui la depozitul temporar din unitate
- b) este de unică folosință și se elimină odată cu conținutul;
- c) poate fi reprezentat de: cutie de carton, sac galben sau negru

3. Protocolul de asigurare a îngrijirilor de urgență, în caz de expunere accidentală cutanată la produse biologice cuprinde:

- a) aplicarea imediată a unei soluții de alcool 70°
- b) lipsa sângerării, deoarece poate crea microleziuni care pot accelera difuziunea virusului
- c) spălarea imediată cu apă și săpun, clătire, apoi aplicarea unui antiseptic cu timp de contact minim 5 minute

4. Instrumentarul stomatologic este considerat:

- a) echipament critic
- b) echipament noncritic
- c) echipament semicritic

5. Se consideră o mână curată pentru personalul mediu și medical, dacă încărcătura microbiană nepatogenă:

- a) nu este mai mare de 40 UFC/ml
- b) este cuprinsă între 10 - 20 UFC/ml
- c) nu este mai mare de 100 UFC/ml

6. Sacii negri sau transparenți se folosesc pentru colectarea deșeurilor:

- a) infecțioase

- b) nepericuloase
- c) periculoase

7. Operațiunea prin care sunt distruse microorganismele, inclusiv sporii bacterieni de pe instrumentele medicale poartă numele de:

- a) curățenie
- b) sterilizare
- c) dezinfecție

8. Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România:

- a) exclude răspunderea civilă
- b) membrii nu răspund disciplinar
- c) nu exclude răspunderea civilă, contravențională și penală

9. Furnizorii de educație continuă a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali se stabilesc de către:

- a) angajator
- b) Ministerul Sănătății și de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- c) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

10. Precizați care din afirmațiile următoare este adevărată:

- a) manipularea în condiții de nesiguranță a echipamentelor medicale
- b) igiena mâinilor este întotdeauna etapă finală după îndepărtarea și aruncarea echipamentului individual de protecție
- c) igiena mâinilor este nesemnificativă în reducerea riscului de răspândire a infecțiilor

11. Consimțământul pacientului nu este obligatoriu în cazul în care:

- a) informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului
- b) pacientul suferă de boli psihice, caz în care nu este necesar să fie implicat în procesul de luare a deciziei
- c) pacientul este în fază terminală

12. Fișa postului de asistent medical generalist, moașă și asistent medical se avizează de către:

- a) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- b) angajator
- c) nu se avizează

13. Nerealizarea anuală a numărului minim de credite stabilit de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se sancționează cu:

- a) suspendarea dreptului de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv
- b) avertisment
- c) muștrare

14. Echipamentele medicale noncritice:

- a) vin în contact / penetrează țesuturile corpului uman, inclusiv sistemul vascular
- b) vin în contact cu mucoasele intacte, cu excepția mucoasei periodontale, sau cu pielea având soluții de continuitate
- c) nu vin frecvent în contact cu pacientul sau vin în contact numai cu pielea intactă a acestuia

15. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical este un document care cuprinde:

- a) proceduri de practică pentru asistenți medicali
- b) sarcini și responsabilități ce revin asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical în exercitarea profesiei
- c) un ansamblu de principii și reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical

16. În conformitate cu Legea 46/2003, prin îngrijiri terminale se înțelege:

- a) îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătățirea prognozei fatale a stării de boală
- b) orice îngrijire acordată persoanei diagnosticate cu neoplazie
- c) îngrijirile paliative

17. Calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este dovedită doar prin:

- a) avizul de liberă practică, așa cum este el definit în legislația națională
- b) creditele EMC
- c) certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România avizat anual

18. Avizul anual de exercitare a profesiei se acordă :

- a) numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă 3 luni
- b) nu este obligatorie încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională
- c) numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv

19. Controlul și supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical sunt realizate de:

- a) Ministerul Sănătății și de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- b) organizații sindicale
- c) alte organizații profesionale

20. Deșeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice sunt considerate:

- a) periculoase, fiind marcate cu asterisc și au regim special în ceea ce privește managementul acestora
- b) nepericuloase, dar fac obiectul evidențelor cabinetelor stomatologice
- c) nepericuloase, dar sunt colectate separat

21. Procedura de distrugere a majorității microorganismelor patogene sau nepatogene de pe tegument cu ajutorul agenților fizici și/sau chimici, se numește:

- a) asepsie
- b) antisepsie
- c) dezinfectie

22. Produsele biocide care inhibă dezvoltarea sau distruge microorganismele la nivelul tegumentelor sau mucoaselor intacte se numesc:

- a) antiseptice
- b) penicilinaze
- c) aseptice

23. Normele tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale reglementează modul în care se realizează:

- a) ambalarea, stocarea temporară, transportul, colectarea deșeurilor
- b) igiena spațiilor medicale
- c) producerea, tratarea și eliminarea deșeurilor

24. În ce zonă a coroanei dentare smalțul are grosimea maximă:

- a) la ecuatorul coronar
- b) zona cuspizilor molarilor
- c) coletul molarilor

25. Valoarea normală a hemoglobinei la bărbați este:

- a) 12- 16 g/100 ml
- b) 11,2- 16,5 g/100ml
- c) 14- 18 g/100ml

26. Fracturile de mandibulă prin agresiune se întâlnesc cel mai frecvent la grupa de vârstă:

- a) 35-55 ani
- b) 18-20 ani
- c) 20-40 ani

27. Sterilizarea prin aer cald se efectuează în pupinel la:

- a) 100°C
- b) 60°C
- c) 180°C

28. Gutierele se folosesc când aparatele ortodontice necesită:

- a) sprijin pe canini
- b) sprijin pe incisivi
- c) sprijin pe sector de arcadă

29. Valoarea normală a hemoglobinei la copii este:

- a) 11,2- 16,5 g/100ml
- b) 12- 16 g/100 ml
- c) 14- 18 g/100ml

30. Caninul superior permanent erupe normal la:

- a) 11 ani
- b) 10 ani
- c) 9 ani

31. Anodonția face parte din:

- a) anomaliile dentare de număr
- b) anomaliile dentare de formă
- c) anomaliile dentare de poziție

32. Contenția tratamentului diastemei adevărate:

- a) se face până la alinierea incisivilor laterali în contact cu cei centrali
- b) se face până la completarea formulei dentare permanente
- c) se face dacă există tendința la recidivă

33. Ectopia caninului este o anomalie:

- a) de structură
- b) de formă
- c) de poziție

34. Aparatele ortodontice fixe utilizează:

- a) forțele declanșate de limbă
- b) forțele declanșate de arcuri metalice și inele de cauciuc
- c) forțele musculare

35. La vârsta de 6 ani erup:

- a) primii molari inferiori
- b) primii molari superiori
- c) caninii superiori

36. Identificați formula dentară corectă:

- a) I. = 2/2 ; C. = 1/1; P.M. = 1/1; M. = 2/2
- b) I. = 2/2; C. = 1/1; P.M. = 3/3; M. = 2/2
- c) I. = 2/2 ; C. = 1/1; P.M. = 2/2; M. = 3/3

37. Supurațiile difuze (flegmoanele) sunt:

- a) procese virale
- b) procese infecțioase
- c) procese inflamatorii

38. Extractia dinților permanenți se indică:

- a) dinților cu fracturi coronare în smalt
- b) în cazul dinților cu distrucții coronoradiculare întinse
- c) dinților care nu întrețin procese infecțioase

39. În ocluzia deschisă bolta palatină este:

- a) de adâncime medie

- b) îngustă și adâncă
- c) largă și puțin adâncă

40. Trusa de instrumente necesare rezecției apicale cuprinde:

- a) oglindă, pensă, sondă, obturator, spatulă bucală, bisturiu, foarfece, decolatoare, instrumentul pentru trepanație osoasă, chiurete, pensă port ac, ace de sutură, seringi pentru anestezie, materiale pentru sutură, instrumentar mic pentru canale, freze, mat
- b) oglindă, pensă, sondă, spatulă bucală, ace pentru sutură, linguri pentru amprentă, instrument de detartraj
- c) oglindă, pensă, sondă, obturator, spatulă bucală, clești pentru extracție, ciupitor de os

41. În extracțiile dentare sunt folosite ca perechi de instrumente:

- a) cleștii pentru incisivi
- b) cleștii pentru molarii superiori
- c) elevatoarele drepte

42. Din grupul dinților frontali permanenți, primii care erup în cavitatea bucală sunt:

- a) Incisivii centrali inferiori
- b) incisivii centrali superiori
- c) caninii

43. Cleștii folosiți pentru extractia dinților temporari:

- a) au aceeași formă ca și cei folosiți pentru extractia dinților permanenți
- b) au dimensiuni mai mari decât a cleștilor folosiți pentru extractia dinților permanenți
- c) nu au aceeași formă ca și cei folosiți pentru extractia dinților permanenți

44. La autoclav sterilizarea se realizează:

- a) prin vapori de apă sub presiune
- b) prin acțiunea radiațiilor ionice
- c) prin aer cald

45. Erupția dinților temporari începe cu:

- a) incisivii centrali superiori
- b) caninii superiori
- c) incisivii centrali inferiori

46. Pentru prevenirea hemoragiei postextracționale ca tratament local se impune:

- a) evitarea chiuretajului alveolar
- b) aplicarea de iodoform în plaga alveolară
- c) sutura plăgii alveolare

47. Sângerările sunt favorizate în extracțiile dentare în:

- a) diabet
- b) alcoolismul cronic
- c) nevrozele cronice

48. Sindesmotoamele sunt:

- a) instrumente pentru examinat
- b) instrumente asemănătoare elevatoarelor
- c) instrumente pentru anestezie

49. Premolarii sunt dinți caracteristici:

- a) ambelor formule dentare
- b) formulei dentare permanente
- c) formulei dentare temporare

50. În deglutiția infantilă apare:

- a) un contact intim dentar pe zone diferite
- b) un spațiu vertical între cele două maxilare
- c) un contact intim interdental între toți dinții

51. Dentina are origine:

- a) ectodermică
- b) mezo- ectodermică
- c) mezodermică

52. Extracția dentară este contraindicată în:

- a) SIDA
- b) leucemie
- c) diabet

53. Aparatul ortodontic folosit pentru împiedicarea interpunerii limbii între arcade este:

- a) scutul lingual
- b) arcul vestibular
- c) plăcuța palatinală

54. Valoarea normală a VSH (viteza de sedimentare a hematiilor) prin citirea la 1- 2 ore sau 24 de ore este, la bărbați:

- a) 1- 10 mm la oră, 7- 15 mm la două ore
- b) 3- 7 mm la oră, 10- 15 mm la două ore
- c) 2- 13 mm la oră, 12- 17 mm la două ore

55. Ordinea în care erup dinții temporari este:

- a) incisiv central, incisiv lateral, canin, molar unu, molar doi
- b) incisiv central, incisiv lateral, molar unu, canin, molar doi
- c) incisiv central, incisiv lateral, molar unu, molar doi, canin

56. Indicații ale extracției dinților temporari sunt:

- a) dinții cu malpoziție
- b) dinții care au provocat și întreținut procese de osteită și osteomielită
- c) dinții cu modificări coloristice

57. La autoclav sterilizarea instrumentarului în cutii metalice se realizează:

- a) 10min la 60°C
- b) 30min la 121°C
- c) 15min la 60°C

58. Hemoragia apărută la 2-3 ore de la extracție este:

- a) hemoragie imediată prelungită
- b) hemoragie precoce
- c) hemoragie tardivă

59. În masticatie, secționarea alimentelor (incizia) este o caracteristică a:

- a) premolarilor
- b) incisivilor superiori și inferiori
- c) molarilor

60. Prin electromiografie se poate examina:

- a) funcția musculară după potențialul de acțiune,
- b) funcția fonetică a aparatului dento- maxilofacial
- c) funcția estetică a aparatului dento- maxillofacial

61. În masticatie, fărâmițarea alimentelor (tritarea) este o caracteristică a:

- a) tuturor dinților
- b) molarilor
- c) incisivilor

62. Cea mai frecventă cauză a ectopei de canin este:

- a) reducerea sau absența spațului pe arcadă
- b) existența unui capac osos dens
- c) existența unei fibromucoase dense

63. Valoarea normală a VSH (viteza de sedimentare a hematiilor) prin citirea la 1- 2 ore sau 24 de ore este, la femei:

- a) 2- 13 mm la oră, 12- 17 mm la două ore
- b) 1- 10 mm la oră, 7- 15 mm la două ore
- c) 3- 7 mm la oră, 10- 15 mm la două ore

64. Frecvent, fracturile radiculare se întâlnesc:

- a) la dentiția permanentă
- b) la dentiția temporară
- c) la dentiția mixtă

65. Indicații ale extracției dinților temporari sunt:

- a) dinții cu gangrene care întrețin procese septic, subcutanate sau cornice în limfonodulii perimaxilari
- b) dinții cu modificări coloristice
- c) dinții cu malpoziție

66. Dinții supranumerari fac parte din:

- a) anomaliile dentare de număr

- b) anomaliile dentare de formă
- c) anomaliile dentare de poziție

67. Molarii apar la vârsta de:

- a) 18 ani
- b) 5 ani
- c) 6 ani, 12 ani, după 18 ani

68. Distrofiile dentare se diferențiază în caria simplă prin:

- a) teste de vitalitate pozitive
- b) lipsa dentinei alterate
- c) pierderea de substanță dură dentară

69. Smalțul dentar este de origine:

- a) ecto-mezodermică
- b) mezodermică
- c) ectodermică

70. Chistul radicular are inițial forma:

- a) sferică
- b) bilobată
- c) neregulată

71. Indicații ale extracției dinților temporari sunt:

- a) dinții cu modificări coloristice
- b) dinții cu malpoziție
- c) dinții cu gangrene care au provocat supurații

72. Diagnosticul diferențial al abcesului vestibular se face obligatoriu cu:

- a) adenopatii faciale
- b) furunculele feței
- c) chiste sebacee

73. Incizia abcesului de loja submandibulară necesită:

- a) anestezie generală de scurtă durată
- b) anestezie generală prin intubație oro-traheală
- c) anestezie locală de contact

74. Ectopia interesează în majoritatea cazurilor:

- a) caninii ambelor maxilare
- b) caninul inferior (mandibular)
- c) caninul superior (maxilar)

75. În formula dentară temporară sunt:

- a) 4 incisivi, 4 premolari, 12 molari
- b) 8 incisivi, 4 premolari, 8 molari
- c) 8 incisivi, 4 canini, 8 molari

76. Un cabinet stomatologic este dotat cu:

- a) unit dentar, fotoliu dentar, aparat de detartraj
- b) unit dentar, fotoliu dentar, compresor, aparatură de sterilizat, instrumentar
- c) unit dentar, fotoliu dentar, instrumentar

77. Formula dentară permanentă conține:

- a) 32 de entități morfologice
- b) 20 de entități morfologice
- c) 16 entități morfologice

78. Diastema este spațiul între incisivii centrali:

- a) fără punct de contact pe fața distală
- b) cu punct de contact proximal
- c) fără punct de contact pe fața mezială

79. Extracția dinților permanenți este indicată în următoarele situații:

- a) dinți cu tulburări severe de erupție
- b) dinți supranumerari
- c) dinți cu fracturi orizontale 1/3 apicală

80. Din grupul dinților frontali permanenți, primii care erup în cavitatea bucală sunt:

- a) incisivii centrali superiori
- b) incisivii centrali inferiori
- c) caninii maxilari

81. Dintele are origine:

- a) numai mezodermică
- b) numai ectodermică
- c) ecto- mezodermică

82. Structura dinților permanenți este:

- a) smalț, cement, dentina, camera pulpară
- b) smalț, dentina, camera pulpară
- c) dentina, camera pulpară

83. Tratamentul curativ în alveolita postextracțională urmărește:

- a) oprirea hemoragiei
- b) combaterea anxietatii
- c) combaterea infecției

84. Apoziția osoasă (osteogeneza) are loc:

- a) în zonele de presiune alternată cu tracțiunea
- b) în zonele de tracțiune parodontală
- c) în zonele de presiune parodontală

85. Celulele formatoare de smalț sunt:

- a) ameloblastele

- b) odontoblastele
- c) osteoblastele

86. Identificati formula dentară la dinții de lapte:

- a) I. =1/1; C.=1/1; M. =3/3
- b) I.=2/2; C=1/1; P.M.=2/2; M.=3/3
- c) I. =2/2; C. =1/1; M. =2/2

87. Ectopia caninului are ca principal cauză:

- a) cronologia erupției dinților permanenți
- b) volumul coronar redus
- c) obiceiurile vicioase în copilărie

88. Hemoragia postextracțională tardivă poate fi determinată de:

- a) tulburări ale mecanismului de hemostază
- b) extracția molarului superior
- c) omiterea aplicării tamponamentului

89. Valoarea normală a hemoglobinei la femeii este:

- a) 11,2- 16,5 g/100ml
- b) 12- 16 g/100ml
- c) 14- 18 g/100 ml

90. Rezorbția radacinilor dinților temporari începe:

- a) la 6 luni după încheierea formării rădăcinii
- b) cu 3-4 ani înainte de înlocuire
- c) imediat după încheierea formării rădăcinii

91. Vârsta erupției primului molar permanent este:

- a) 12 ani
- b) 18 ani
- c) 6 ani

92. Care este cea mai frecventă localizare a smalțului aprismatic:

- a) pe pantele cuspidene
- b) la vârful cuspizilor
- c) la colet

93. Conținutul tratamentului diastemei adevărate:

- a) se face până la completarea formulei dentare permanente
- b) se face dacă există tendința la recidivă
- c) se face până la alinierea incisivilor laterali în contact cu cei centrali

94. Extracția dinților permanenți este indicată la:

- a) dinți ce împiedică redresarea ortodontică
- b) dinți cu pulpită
- c) dinți cu carii superficiale

95. În mod normal dentiția mixtă există în perioada cuprinsă între:

- a) 4 - 8 ani
- b) 6 - 11 ani
- c) 6 - 13 ani

96. Soluția de tratament a fracturilor radiculare ale dinților temporari au ca indicație:

- a) tratamentul endodontic
- b) imobilizarea
- c) extracția

97. Pregătirea preoperatorie în vederea rezecției apicale presupune:

- a) pregătirea bolnavului, sterilizarea cleștilor
- b) pregătirea bolnavului (anamneza) pregătirea instrumentarului, pregătirea cavității bucale, poziția bolnavului, pregătirea anesteziei, pregătirea materialelor de obturație și sutură
- c) pregătirea bolnavului, radiografie dentară

98. Valoarea diagnostică a testului de vitalitate în leziunile dento- parodontale este după:

- a) 2 săptămâni
- b) 4-6 luni
- c) 1 lună

99. Materialul moale se sterilizează:

- a) prin fierbere
- b) la autoclav
- c) la pupinel

100. Primii dinți permanenți erupți în cavitatea bucală sunt:

- a) molarii primi mandibulari
- b) incisivii centrali superiori
- c) molarii primi maxilari