

EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL

Sesiunea 2017

SPECIALITATEA**STOMATOLOGIE****TEST - GRILĂ
DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR**

1. Distrugerea majorității microorganismelor patogene sau nepatogene de pe tegument cu ajutorul agenților fizici și/sau chimici, se numește:

- a) antisepsie
- b) asepsie
- c) dezinfectie

2. Controlul aeromicroflorei presupune:

- a) utilizarea metodei sedimentării Koch sau a metodei volumetrică
- b) determinarea gradului de încărcare a aerului cu flora microbiană din zonele cu risc
- c) recoltarea probei numai după ce a expirat timpul de contact al soluției dezinfectante utilizate

3. În conformitate cu Legea 46/2003, prin îngrijiri terminale se înțelege:

- a) orice îngrijire acordată persoanei diagnosticată cu neoplazie
- b) îngrijirile paliative
- c) îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătățirea prognozei fatale a stării de boală

4. Avizul anual de exercitare a profesiei se acordă :

- a) numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv
- b) numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă 3 luni
- c) nu este obligatorie încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională

5. Deșeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice sunt considerate:

- a) nepericuloase, dar fac obiectul evidențelor cabinetelor stomatologice
- b) nepericuloase, dar sunt colectate separat
- c) periculoase, fiind marcate cu asterisc și au regim special în ceea ce privește managementul acestora

6. Furnizorii de educație continuă a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali se stabilesc de către:

- a) Ministerul Sănătății în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice

b) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în colaborare cu Ministerul Sănătății

c) angajator

7. Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România:

a) nu exclude răspunderea civilă, contravențională și penală

b) exclude răspunderea civilă

c) membrii nu răspund disciplinar

8. În conformitate cu Legea 46/2003, prin intervenție medicală se înțelege:

a) orice tratament preventiv sau curativ care se aplică pacienților internați într-o unitate sanitară

b) orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare

c) totalitatea manevrelor efectuate în scop diagnostic

9. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical este un document care cuprinde:

a) proceduri de practică pentru asistenți medicali

b) sarcini și responsabilități ce revin asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical în exercitarea profesiei

c) un ansamblu de principii și reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical

10. Produsele de curățare:

a) sunt manipulate cu protecție manuală

b) se amestecă în vederea obținerii unui produs de calitate superioară

c) se depozitează pe termen lung în secții în vederea utilizării

11. Fișa postului de asistent medical generalist, moașă și asistent medical se avizează de către:

a) nu se avizează

b) angajator

c) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

12. Controlul și supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical sunt realizate de:

a) Ministerul Sănătății și de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

b) alte organizații profesionale

c) organizații sindicale

13. Consimțământul pacientului nu este obligatoriu în cazul în care:

a) pacientul suferă de boli psihice, caz în care nu este necesar să fie implicat în procesul de luare a deciziei

b) informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului

c) pacientul este în fază terminală

14. Nerealizarea anuală a numărului minim de credite stabilit de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România se sancționează cu:

a) avertisment

b) muștrare

c) suspendarea dreptului de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv

15. Distrugerea microorganismelor, inclusiv a sporilor bacterieni de pe instrumentele medicale, poartă numele de:

a) dezinfectie

b) curățenie

c) sterilizare

16. Produsele biocide care inhibă dezvoltarea sau distrug microorganismele la nivelul tegumentelor sau mucoaselor intacte se numesc:

a) aseptice

b) antiseptice

c) penicilinaze

17. Calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România, este dovedită prin:

a) orice documente

b) certificatul de membru

c) documente de studii care atestă formarea în profesie

18. Sistemul epidemiologic de supraveghere a stării de sănătate a personalului expus profesional și a condițiilor de igienă în unitățile medicale în care se desfășoară activități nucleare este organizat la nivelul:

a) CNCAN

b) Ministerul Mediului

c) Ministerul Sănătății

19. Mijloacele fizice de dezinfectie sunt:

a) raze ultraviolete ca metodă unică și eficace pentru dezinfectia suprafețelor netede din sălile de operație

b) căldura umedă utilizată pentru microaerofloră

c) flambarea, doar pentru instrumentele folosite în laboratorul de microbiologie

20. Colectarea deșeurilor periculoase rezultate din activitățile medicale se face în recipiente:

a) de unică folosință care se elimină odată cu conținutul

b) cutie de carton, sac galben sau negru

c) de culoare galbenă, din plastic rigid sau carton, în funcție de tipul de deșeu colectat, și se golește într-un recipient mai plin în vederea predării lui la depozitul temporar din unitate

21. Ce facem în cazul unor traumatisme mari ale masivului facial, cu fracturi de mandibulă și insuficiență respirator acută?

- a) oxigenoterapie
- b) intubație oro-traheală
- c) traheostomie

22. Morfologic, cel de-al doilea molar temporar este o copie fidelă a:

- a) molarului de 6 ani
- b) molarului de minte
- c) molarului de 12 ani

23. Sindesmotoamele sunt:

- a) instrumente pentru anestezie
- b) instrumente asemănătoare elevatoarelor
- c) instrumente pentru examinat

24. Zona de sprijin a câmpului protetic edentat total cuprinde:

- a) mucoasa pasiv- mobilă
- b) crestele alveolare
- c) mucoasa mobilă

25. Fiola deschisă se menține cu:

- a) policele, indexul și mediusul mâinii stângi
- b) policele și mediusul mâinii drepte
- c) policele și indexul mâinii stângi

26. Prin apropierea cronică a mandibulei de maxilar, capul condilului se deplasează:

- a) proximal
- b) distal
- c) medial

27. În formula dentară temporară sunt:

- a) 8 incisivi, 4 canini, 8 molari
- b) 8 incisivi, 4 premolari, 8 molari
- c) 4 incisivi, 4 premolari, 12 molari

28. Celulele formatoare de smalt sunt:

- a) ameloblastele
- b) osteoblastele
- c) odontoblastele

29. Poziția pacienților în injectarea anticoagulantelor este:

- a) decubit sau șezând
- b) decubit lateral
- c) decubit ventral

30. În stomatite nu întâlnim:

- a) alterarea profundă a stării generale, hipotensiune, stare de șoc

- b) salivația abundentă
- c) tumefacția mucoaselor, durere

31. Indicații ale extracției dinților temporari sunt:

- a) dinții care au provocat și întreținut procese de osteită și osteomielită
- b) dinții cu malpoziție
- c) dinții cu modificări coloristice

32. Erupția dentară este:

- a) o leziune simplă odontală
- b) un fenomen social
- c) un fenomen de creștere

33. Erupția dentară este reprezentată de:

- a) coroana dentară
- b) mugurele dentar
- c) migrarea dinților din zona osoasă în cavitatea bucală

34. Sângerările sunt favorizate în extracțiile dentare în:

- a) diabet
- b) alcoolismul cronic
- c) nevrozele cronice

35. Indicații ale extracției dinților temporari sunt:

- a) dinții cu malpoziție
- b) dinții cu gangrene care întrețin procese septice, subcutanate sau cornice în limfonodulii perimaxilari
- c) dinții cu modificări coloristice

36. Autoclavul folosește pentru sterilizare:

- a) vaporii chimici sub presiune
- b) vaporii supraîncălziți sub presiune
- c) aerul uscat

37. Ectopia caninului este o anomalie:

- a) de formă
- b) de structură
- c) de poziție

38. Resuscitarea respiratorie este indicată:

- a) în congestie pulmonară
- b) în pleurezie
- c) în insuficiență respiratorie acută

39. Moartea clinică este:

- a) oprirea circulației și respirației
- b) moartea neuronilor datorită anoxiei cerebrale
- c) intervalul de timp între oprirea inimii și moartea neuronilor

40. Premolarii sunt dinți caracteristici:

- a) ambelor formule dentare
- b) formulei dentare temporare
- c) formulei dentare permanente

41. Valoarea normală a hemoglobinei la femei este:

- a) 14- 18 g/100 ml
- b) 12- 16 g/100ml
- c) 11,2- 16,5 g/100ml

42. Supurațiile difuze (flegmoanele) sunt:

- a) procese infecțioase
- b) procese virale
- c) procese inflamatorii

43. Câte picături are un gram de soluție apoasă:

- a) 45-50 picături
- b) 20-25 picături
- c) 60-65 picături

44. Formula dentară permanentă conține:

- a) 20 de entități morfologice
- b) 32 de entități morfologice
- c) 16 entități morfologice

45. În deglutiția infantilă apare:

- a) un contact intim dentar pe zone diferite
- b) un contact intim interdental între toți dinții
- c) un spațiu vertical între cele două maxilare

46. Administrarea medicamentelor de către asistentul medical se face în condiții:

- a) de igienă, asepsie, dezinfecție și menținerea normelor de control a infecțiilor nosocomiale
- b) de igienă, asepsie, sterilizare
- c) de dezinfecție

47. Valoarea normală a hemoglobinei la bărbați este:

- a) 14- 18 g/100ml
- b) 11,2- 16,5 g/100ml
- c) 12- 16 g/100 ml

48. Insulina se păstrează:

- a) congelator
- b) în dulapul de medicamente, dar ferit de lumină
- c) la rece (frigider)

49. Indicații ale extracției dinților temporari sunt:

- a) dinții cu modificări coloristice
- b) dinții cu gangrene care au provocat supurații
- c) dinții cu malpoziție

50. Sterilizarea urmărește:

- a) distrugerea tuturor germenilor, inclusiv a formelor sporulate și a virusurilor
- b) profilaxia infecțiilor plăgilor operatorii
- c) dezinfecția căzilor, băilor, ploștilor

51. În masticăție, secționarea alimentelor (incizia) este o caracteristică a:

- a) Incisivilor superiori și inferiori
- b) premolarilor
- c) molarilor

52. În extracțiile dentare sunt folosite ca perechi de instrumente:

- a) cleștii pentru molarii superiori
- b) cleștii pentru incisivi
- c) elevatoarele drepte

53. Valoarea diagnostică a testului de vitalitate în leziunile dento- parodontale este după:

- a) 2 săptămâni
- b) 4-6 luni
- c) 1 lună

54. În erupția dentară, cel mai important rol îl are vitamina:

- a) D
- b) C
- c) A

55. Soluția de tratament a fracturilor radiculare ale dinților temporari au ca indicație:

- a) extracția
- b) imobilizarea
- c) tratamentul endodontic

56. În insuficiența respiratorie, prima manoperă întreprinsă este:

- a) asigurarea și menținerea libertății căilor aeriene
- b) respirația artificială
- c) oxigenoterapia

57. Tratamentul mecanic al gangrenei este o fază:

- a) incompletă
- b) completă
- c) definitivă

58. Parodontita este:

- a) o boală care atacă țesuturile de susținere ale dinților

- b) o afecțiune a gingiilor
- c) o inflamație a cavității bucale

59. Premolarii sunt dinți caracteristici:

- a) ambelor formule dentare
- b) formulei dentare permanente
- c) formulei dentare temporare

60. Câte picături are un gram de soluție uleioasă:

- a) 45-50 picături
- b) 30-40 picături
- c) 50-60 picături

61. Anodonția face parte din:

- a) anomaliile dentare de formă
- b) anomaliile dentare de număr
- c) anomaliile dentare de poziție

62. Care este termenul de valabilitate al sterilizării instrumentarului chirurgical și al materialului moale sterilizat la pupinel sau autoclav:

- a) 24 ore de la efectuarea sterilizării
- b) termen nelimitat dacă nu s-au deschis cutiile de instrumente sau casoletele
- c) 48 de ore de la efectuarea sterilizării

63. Ectopia interesează în majoritatea cazurilor:

- a) caninul inferior (mandibular)
- b) caninii ambelor maxilare
- c) caninul superior (maxilar)

64. Doza maximă a unui medicament este:

- a) doza administrată în scop terapeutic fără efect toxic
- b) doza administrată în cantitatea cea mai mare fără acțiune toxică asupra organismului
- c) doza care conduce la deces

65. Zona de succiune a câmpului protetic edentat total cuprinde:

- a) bolta palatină
- b) tuberozitățile maxilare
- c) mucoasa care vine în contact cu

66. Forma incisivilor temporari este:

- a) diferită de cea a dinților permanenți
- b) identică cu cea a dinților permanenți
- c) asemănătoare cu cea a dinților permanenți

67. Smalțul dentar este de origine:

- a) mezodermică
- b) ecto-mezodermică

c) ectodermică

68. Aparatul ortodontic folosit pentru împiedicarea interpunerii limbii între arcade este:

- a) scutul lingual
- b) arcul vestibular
- c) plăcuța palatinală

69. Gura de lup constă în:

- a) despicătură de interesează numai buza superioară
- b) despicătură ce interesează atât buza superioară cât și cerul gurii (palatul) sau numai vălul palatin
- c) despicătură parțială a vălului palatin

70. Vârsta erupției primului molar permanent este:

- a) 12 ani
- b) 6 ani
- c) 18 ani

71. Dentina are origine:

- a) mezo- ectodermică
- b) mezodermică
- c) ectodermică

72. Fracturile de mandibulă prin agresiune se întâlnesc cel mai frecvent la grupa de vârstă:

- a) 35-55 ani
- b) 18-20 ani
- c) 20-40 ani

73. Apozitia osoasă (osteogeneza) are loc:

- a) în zonele de presiune alternată cu tracțiunea
- b) în zonele de tracțiune parodontală
- c) în zonele de presiune parodontală,

74. Din grupul dinților frontali permanenți, primii care erup în cavitatea bucală sunt:

- a) caninii maxilari
- b) incisivii centrali superiori
- c) incisivii centrali inferiori

75. În ce zonă a coroanei dentare smalțul are grosimea maximă:

- a) la nivelul cuspizilor
- b) la coletul molarilor
- c) la ecuatorul coronar

76. Prin electromiografie se poate examina:

- a) funcția musculară după potențialul de acțiune
- b) funcția fonetică a aparatului dento- maxilofacial

c) funcția estetică a aparatului dento- maxillofacial

77. Primii dinți permanenți erupți în cavitatea bucală sunt:

- a) molarii primi maxilari
- b) incisivii centrali superiori
- c) molarii primi mandibulari

78. Injecția subcutanată aparține obligațiilor asistentei și constă în:

- a) efectuarea injecției în grosimea pielii
- b) efectuarea injecției sub piele în țesutul celular subcutanat sau hipodermic
- c) efectuarea injecției în țesut muscular

79. Garoul elastic se aplică deasupra locului puncției la aproximativ:

- a) 20 cm
- b) 10 cm
- c) 5 cm

80. Provocarea hipoglicemiei poate fi atribuită:

- a) unui aport alimentar mai bogat decât cel planificat în dietă
- b) unei doze minime de insulină decât cea prescrisă
- c) unei doze prea mare de insulină

81. Chistul radicular are inițial forma:

- a) neregulată
- b) sferică
- c) bilobată

82. Depozitarea medicamentelor se face în:

- a) dulapuri compartimentate
- b) noptiere
- c) dulapuri speciale

83. În buza de iepure se constată:

- a) despicătura totală a cerului gurii și a vălului palatin
- b) o despicătură ce interesează numai buza superioară
- c) despicătura parțială a vălului palatin

84. Zona linguală centrală se întinde pe o distanță de:

- a) 3 cm
- b) 1,5 cm
- c) 6 cm

85. Spasmul glotic poate fi provocat de:

- a) înec
- b) proteze dentare deplasate sau rupte
- c) intoxicații cu substanțe convulsivante

86. Molarul de 6 ani pierdut precoce produce:

- a) perturbări în plan sagital
- b) perturbări în plan vertica
- c) perturbări în plan transversal

87. Dinții temporari au camera pulpară:

- a) identică cu cea a dinților permanenți
- b) deosebit de mică față de cea a dinților permanenți
- c) deosebit de voluminoasă față de cea a dinților permanenți

88. Dintele are origine:

- a) numai mezodermică
- b) ecto- mezodermică
- c) numai ectodermică

89. Dinții supranumerari fac parte din:

- a) anomaliile dentare de număr
- b) anomaliile dentare de poziție
- c) anomaliile dentare de formă

90. Valoarea normală a hemoglobinei la copii este:

- a) 14- 18 g/100ml
- b) 12- 16 g/100 ml
- c) 11,2- 16,5 g/100ml

91. Medicamentele sunt substanțe extrase din:

- a) sunt extrase sau sintetizate din produse de origine minerală, vegetală sau animală
- b) produse de origine animală
- c) produse de orgine minerală

92. Ce se înțelege prin resuscitare cardio-respiratorie:

- a) combaterea și tratarea insuficienței cardiace
- b) măsurile întreprinse pentru restabilirea activității cardiace
- c) combaterea și tratarea afecțiunilor pulmonare

93. Pentru pacientul cu intoleranță digestivă sau intervenții chirurgicale la nivelul tubului digestiv se recomandă calea:

- a) rectală
- b) orală
- c) respiratorie

94. Frecvent fracturile radiculare se întâlnesc:

- a) la dentiția mixtă
- b) la dentiția permanentă
- c) la dentiția temporară

95. Dinții permanenți, cu excepția molarului de minte, erup între:

- a) 7- 8 ani
- b) 6- 13 ani

c) 1- 11 ani

96. Indicația de traheostomie se face în:

- a) intoxicații voluntare
- b) în tratarea infecțiilor pleuro-pulmonare
- c) traumatisme toracice cu fracturi costale multiple și volet costal

97. Meziodensul (al treilea central superior) este considerat:

- a) o perturbare în erupție
- b) o formă de atavism
- c) o anomalie

98. Ce este gangrena pulpară?

- a) o leziune odontală simplă
- b) o necroză a structurilor pulpare, urmată de invazie bacteriană
- c) un traumatism coronar

99. În masticatie, fărâmițarea alimentelor (tritarea) este o caracteristică a:

- a) incisivilor
- b) a tuturor dinților
- c) molarilor

100. La proba lingurii maxilare în cavitatea bucală se va aplica mai întâi:

- a) marginea anterioară a lingurii
- b) marginea posterioară a lingurii
- c) marginea vestibulară a lingurii